

2018 一般物理学 練習問題 (力学)

注) 途中式などは省略せず記述すること。

必要であれば重力加速度は g として用いよ。

出題されているモデルの物体はいずれも質点であり、
大きさは無視できるものとする。

1. 力学の基礎的な物理量について答えよ。

(1) 速度 V の定義式とその次元を記述せよ。

(2) 加速度 a の定義式とその次元を記述せよ。

(3) 力 F は $= F$ と表される。

その次元は である。

(4) (3)の式は運動方程式であり、この式を変形することにより
さまざまな物理量を導くことができる。

(3)の式の両辺を x で積分し、式を整理すると

$$\int m \frac{dv}{dt} dx = \int F dx$$

$$\int m \frac{dv}{dt} v dt = \int F dx$$

$$\int \left(m \frac{dv}{dt} v \right) dt = \int F dx$$

$$\int \frac{d}{dt} \left(\text{①} \right) dt = \int F dx$$

となる。

左辺の①の部分は運動エネルギーを右辺は仕事を表している。運動エネルギーの次元は であり、仕事の次元は である。

(5) また、(3)の式を変形すると

$$\frac{d}{dt} \left(\text{②} \right) = F$$

と表される。

②の部分は運動量であり、その次元は である。

②を p とおくと

$$\frac{d}{dt}(p) = F \qquad dp = Fdt$$

この左辺 Fdt が力積であり、その次元は である。

(6) さらに、(3)の式をベクトルで考え、両辺に左側から位置ベクトル $\vec{r}$ の外積を取ると

$$\vec{r} \times m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\vec{r} \times \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = \vec{r} \times \vec{F} \quad \cdots (A)$$

となる。

ここで、

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(\vec{r} \times m\vec{v}) &= \frac{d\vec{r}}{dt} \times m\vec{v} + \vec{r} \times \frac{d}{dt}(m\vec{v}) \\ &= \boxed{\textcircled{3}} \times m\vec{v} + \vec{r} \times \frac{d}{dt}(m\vec{v}) \\ &= \boxed{\textcircled{4}}\end{aligned}$$

であるから、式 (A) は

$$\frac{d}{dt}(\boxed{\textcircled{5}}) = \boxed{\textcircled{6}}$$

と表される。

左辺の⑤は角運動量 $\vec{L}$ であり、

その次元は である。

右辺の⑥は力のモーメント $\vec{N}$ であり、

その次元は である。


この式は

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{N}$$


と表すことができ、これを「回転の運動方程式」と呼ぶ。

2. 以下の運動について物体に作用する力を図に書き込み、その運動の運動方程式を記述せよ。
 いずれの運動も物体の質量は m とし、重力加速度は g とする。

- (1) 一定の加速度 a で上昇するエレベータ内で物体を鉛直投げ上げさせる運動 (初速度 v_0)




- (2) 摩擦力が働く斜面を滑り降りる運動
 (動摩擦係数は $\mu_k = \frac{f}{N}$ とする)



(3) 単振り子の運動


極座標で軸を考え記述せよ。

(糸の張力は S とし、 r 方向、 θ 方向の加速度を a_r, a_θ とする。)




3. 以下の図の力のモーメント $\vec{N}$ を計算し、 $|\vec{N}|$ を求めよ。
但し、棒の質量は無視できるとする。

(1)



(2)



4. 質量 m の物体を地表から鉛直投げ上げる運動を考える。

初速度 $v(0) = v_0$ として以下の問いに答えよ。

(1) 運動中に物体に作用する力を書き込め。

(2) この運動の運動方程式を記述せよ。

(3) 運動方程式から速度 $v(t)$ を導け。

(4) 運動方程式から変位 $x(t)$ を導け。

(5) 再び地表に戻ってくる時刻 t_1 を求めよ。

(6) ある時刻 t ($t \leq t_1$) での運動エネルギー $K(t)$ を求めよ。

(7) ある時刻 t ($t \leq t_1$) での位置エネルギー $U(t)$ を求めよ。

(8) 力学的エネルギー $E(t) = K(t) + U(t)$ ($t \leq t_1$) が
時間に寄らず一定であることを示せ。

(9) 運動エネルギー $K(t)$ 、位置エネルギー $U(t)$ 、全力学的
エネルギー $E(t)$ をそれぞれ時間 t のグラフで表せ。
但し、 $t \leq t_1$ とする。


(10) 地表に衝突する瞬間の速度 v_1 を求めよ。

衝突において力 F が作用したとする。また、この力 F は重力に比べて十分大きく、衝突中の重力の効果は無視できるとする。

(11) 地表に衝突する瞬間の運動方程式を記述せよ。

(12) この衝突は完全弾性衝突であった。


物体が地表から受けた力積 I を求めよ。



5. 質量 m の物体を高さ h から自由落下させる。

以下の問に答えよ。

但し、重力加速度は g とする。




(1) 物体に作用する力を書き込め。

(2) この運動の運動方程式を記述せよ。

(3) この運動において力学的エネルギーが保存していることを運動方程式を x で積分することで導き、力学的エネルギーを求めよ。

6. 質量 m の雨滴が落下する運動を考える。

このとき、空気抵抗が働くものとし、
その空気の抵抗力の大きさは $k\nu$ とする。
以下の問に答えよ。



(1) 物体に作用する力を書き込め。

(2) この運動の運動方程式を記述せよ。

運動方程式を解くと、速度 $\nu(t)$ は $\nu(t) = \frac{mg}{k} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right)$ となる。

(3) $\nu - t$ グラフを書け。また、原点での傾きを求めよ。

(4) 十分時間が経過した状態の速度を記述せよ。

7. 摩擦がある斜面を質量 m の物体がすべり降りる運動の運動を考える。以下の問に答えよ。

但し、動摩擦力は $f = \mu_k N$ として用いてよいとする。

(1) この運動の運動方程式を記述せよ。

(2) この運動の加速度 a を求め、この運動が等加速度運動であることを示せ。


(3) この運動で物体が距離 L を移動したとするととき、動摩擦力がした仕事 $W_{\text{摩}}$ を求めよ。

8.一定の加速度 a で下降するエレベータがある。

このエレベータ内に質量 m の物体が床に置かれている。

以下の問に答えよ。(但し、重力加速度は g として用いること)

- (1) 物体に作用する力を記入せよ。
- (2) 物体が床から受ける垂直抗力 N を求めよ。
- (3) 物体が無重量になるための条件を求めよ。




9. 図のような長さ L の棒の両端に質量 m の質点と質量 M の質点を取り付けられ、糸でつるさている。

この棒が回転しない条件を考えたい。以下の問いに答えよ。

棒の質量を m とした場合

- (1) 糸でつるされている点を支点として、質量 m, M の質点及び棒の力のモーメント $\vec{N}$ をそれぞれ求めよ。
- (2) 棒の回転の運動方程式を記述せよ。
- (3) 棒が動かないための糸をつるす位置 x を求めよ。



10. 物体が半径 r_0 の円周上を速さ v_0 で等速円運動している。
 r_0, v_0 は定数である。以下の問いに答えよ。

- (1) 速度 $\vec{v}$ と位置ベクトル $\vec{r}$ が直交していることを示せ。
- (2) 速度 $\vec{v}$ と加速度 $\vec{a}$ が直交していることを示せ
- (3) 加速度の大きさ $|\vec{a}|$ を求めよ。

11. 図のような円運動のモデルを考える。

糸の長さは l 、物体の質量は m である。

物体を水平の状態にして放し、円運動させたとする。


以下の問いに答えよ。

ある時刻 t で糸と鉛直線のなす角を θ として用いよう。

(1) r 方向、 θ 方向の加速度を a_r, a_θ としたとき、
それぞれの方向の運動方程式を記述せよ。

(2) 最下点 B での糸の張力 T_B を求めよ。

(3) 点 C でのなす角を θ_C とする。糸の張力 T_C を求めよ。



12. 図のような円運動のモデルを考える。

糸の長さは r 、物体の質量は m である。

最下点で水平方向に初速 v_0 を与えたとき

以下の問いに答えよ。

ある時刻 t で糸と鉛直線のなす角を θ として用いよう。

(1) r 方向、 θ 方向の加速度を a_r, a_θ としたとき、
それぞれの方向の運動方程式を記述せよ。

(2) 物体が1回転するために必要な初速 v_0 の条件を求めよ。

